DOI: 10.31393/reports-vnmedical-2020-24(4)-29

УДК: 618.15 002+577.18+546.221.1

ІНТРАВАГІНАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ КЛІНДАМІЦИНУ ФОСФАТУ В ТЕРАПІЇ БАКТЕРІАЛЬНОГО ВАГІНОЗУ: ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАКОКІНЕТИКИ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ В ОРГАНІЗМІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Гребенюк Д. І., Таран І. В., Назарчук О. А.

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018)

Відповідальний за листування:
e-mail: Doctor.Svo@gmail.com

Статтю отримано 16 жовтня 2020 р.; прийнято до друку 05 листопада 2020 р.

Анотація. У статті наведено огляд сучасних літературних даних щодо проблематики бактеріального вагінозу, його терапії кліндамицином, фармакокінетики даного фармакологічного препарату та потенційного впливу фонових рівнів гідроген сульфідів в організмі на фармакокінетику лікарських засобів. З баз даних PubMed, ScienceDirect, UpToDate відібрано 50 джерел, що відповідали умовам запиту: найновіші публікації (за останні 5 років), або останні публікації з даної проблеми (незалежно від давності). Широкий та різноплановий вплив ендogenous гідроген сульфідів на перебіг біохімічних та фізіологічних процесів в організмі спонукає до вивчення його потенційного модулюючого впливу на фармакологічні властивості препаратів. Доклінічне дослідження фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів (зокрема, кліндамицину) дозволить в подальшому оптимізувати діагностично-терапевтичні схеми з урахуванням рівня гідроген сульфідів в організмі, а також створить передумови для розробки нових ефективних фармацевтичних композицій антибіотиків та донаторів гідроген сульфідів.

Ключові слова: бактеріальний вагіноз; кліндамицину фосфат; гідроген сульфід; фармакокінетика.

Вступ

Незважаючи на значні успіхи сучасних технологій в клінічній мікробіології, фармакології антибактеріальних препаратів, запальні захворювання нижнього відділу статевих трактів продовжують займати провідне місце в структурі акушерсько-гінекологічної патології. В зв'язку з високою частотою розвитку, інфекційні захворювання піхви, викликані умовно-патогенними мікроорганізмами та/або мікроорганізмами, що входять до складу нормальної мікрофлори статевих шляхів жінок, є надзвичайно проблемними та актуальними. Найбільш значущим із них є бактеріальний вагіноз [2, 26].

Хоча протягом багатьох років одним із препаратів вибору для патогенетично обумовленого лікування бактеріального вагінозу залишається кліндамицин [14, 19, 21, 43], проте дослідження його фармакокінетики при місцевому введенні у формі супозиторіїв демонструє широкий діапазон значень фармакокінетичних показників. На нашу думку, причиною даного феномену можуть бути певні ендogenous чинники, які варіюють у різних жінок. До одного із таких ендogenous модулаторів відносять гідроген сульфід, який регулює широке коло біохімічних та фізіологічних процесів [28].

Мета дослідження - проаналізувати сучасні літературні дані щодо локальної антибіотикотерапії бактеріального вагінозу кліндамицином, фармакокінетичних особливостей препарату в таких умовах застосування та можливості потенційного впливу ендogenous гідроген сульфідів на фармакокінетику кліндамицину.

Матеріали та методи

У ході виконання ретроспективного літературного

пошуку використовували бази PubMed, ScienceDirect, UpToDate. Під час пошуку нами були застосовані різні комбінації наступних ключових слів: "bacterial vaginosis", "clindamycin phosphate", "hydrogen sulfide", "pharmacokinetics". При опрацюванні результатів пошуку перевага віддавалася або найновішим публікаціям (за останні 5 років), або останнім публікаціям з даної проблеми (незалежно від давності). Після огляду анотацій статей та ознайомлення з їх повним текстом, було відібрано 50 джерел, що відповідали умовам запиту. Нижче наведено огляд та детальний аналіз оригінальних статей щодо досліджуваної проблеми.

Результати. Обговорення

Бактеріальний вагіноз

Бактеріальний вагіноз або дисбактеріоз піхви - один із найбільш поширених патологічних станів, пов'язаних із аберантними змінами мікробіома піхви [2].

Поширеність даної патології варіює як на міжнародному рівні, так і в середині країн та коливається від 20 до 60%. Захворюваність серед невагітних жінок становить 15-35,5%, а серед вагітних вона досягає 38% [2, 26].

Бактеріальний вагіноз характеризується зниженням рівня резидентної молочної кислоти, яка продукується *Lactobacillus spp.* та наступним надмірним ростом анаеробних бактерій, таких як *Gardnerella vaginalis*, *Megasphaera spp.*, *Atopobium vaginae* [7, 45, 36, 44].

До факторів ризику розвитку бактеріального вагінозу відносять: раніше перенесені захворювання статевих органів запального характеру; тривалий і безконт-

рольний прийом антибактеріальних препаратів; наявність різних порушень менструального циклу; наявність фонових процесів шийки матки; тривале застосування внутриматкових спіралей з метою контрацепції; застосування оральних контрацептивів [9].

Дана патологія є серйозною проблемою для охорони здоров'я жінок репродуктивного віку, їхніх дітей та партнерів, оскільки бактеріальний вагіноз асоціюється з несприятливими наслідками для репродуктивного здоров'я, такими як запальні захворювання органів малого таза, викидні, передчасні пологи, а також може призводити до підвищеного ризику зараження вірусом імунодефіциту людини [13, 31, 35, 37].

Успішне лікування бактеріального вагінозу залежить від правильної та своєчасної постановки діагнозу та проведення патогенетично обґрунтованої терапії. Мета лікування бактеріального вагінозу - відновити нормальну мікрофлору піхви та затримати ріст мікроорганізмів, не характерних для цього мікробіоценозу.

Протягом багатьох років одним із препаратів вибору для патогенетично обумовленого лікування бактеріального вагінозу залишається кліндаміцин [14, 19, 21, 43].

Кліндаміцин

Кліндаміцин - лінкозамідний антибіотик, розроблений у 1966 році шляхом хімічної модифікації природного лінкоміцину. Спектр дії *in vitro* включає стафілококи, стрептококи та пневмококи, більшість анаеробних бактерій (включаючи понад 90% *Bacteroides fragilis*), *Chlamydia trachomatis* та деякі найпростіші. Як і пеніцилін, він має активність проти стрептококів групи А та групи В, мікроаерофільних стрептококів та більшості *Streptococcus pneumoniae*. Однак він не має активності проти ентерококів. Подібно клоксациліну та цефалоспоринам, кліндаміцин має активність проти *Staphylococcus aureus*. Він має ширше анаеробний охоплення, ніж більшість цефалоспоринов, але практично не має активності проти аеробних грамнегативних бактерій. Завдяки своїй чудовій активності як проти грампозитивних коків, так і проти грампозитивних або грамнегативних анаеробів, кліндаміцин відіграє важливу роль у лікуванні інфекцій голови та шиї, органів дихання, кісток та м'яких тканин, черевної порожнини та таза [39].

Кліндаміцин діє, пригнічуючи синтез бактеріального білка на рівні 50S субодиноці рибосоми. Як результат, він створює тривалий постантибіотичний ефект. Це може зменшити продукцію токсину та збільшити мікробну опсонізацію та фагоцитоз навіть при субінгібіторних концентраціях. Хоча хімічно кліндаміцин несхожий на еритроміцин та макролідні антибіотики, антагонізм *in vitro* виникає в результаті подібного місця зв'язування та механізму дії [39, 42].

Кліндаміцин доступний у вигляді таблеток для перорального застосування (150 та 300 мг), парентеральних ін'єкцій (внутрішньом'язово або внутрішньовенно), а також місцевих та вагінальних препаратів. Звичайні парентеральні дози становлять 600 мг кожні 6-8 годин та 900

мг кожні 8 годин. Типові пероральні дози - від 150 до 450 мг на добу. Місцеві склади включають 2% мазь і 2% вагінальний гель.

Кліндаміцин призначається для лікування тазових інфекцій, включаючи запальні захворювання органів малого таза, абсцеси таза, ендометрит та бактеріальний вагіноз [15, 29, 33, 38]. Препарат застосовувався під час вагітності та класифікується як фактор ризику розвитку плода В. Немає повідомлень про вроджені дефекти та іншу токсичність для плода. Кліндаміцин проникає через плаценту та присутній у грудному молоці.

Кліндаміцин у пероральній формі або у вигляді вагінального гелю ефективний для лікування бактеріального вагінозу як у вагітних, так і у невагітних пацієнток [9, 21; 22, 37; 41, 43]. На додаток до своєї ефективності у безпосередньому лікуванні симптоматичного бактеріального вагінозу, застосування кліндаміцину опосередковано покращує результати вагітності, скорочуючи частоту ускладненого перебігу. У пацієнток наявність бактеріального вагінозу корелює із частотою передчасних пологів, хоча результати дослідження ефективності лікування бактеріального вагінозу при подовженому терміні вагітності є суперечливими [18, 25]. У рандомізованому дослідженні 103 вагітних із бактеріальним вагінозом та передчасними пологамі кліндаміцин був більш ефективним, ніж плацебо, у продовженні вагітності (36 днів проти 19 днів), при незначному збільшенні ваги при народженні [32]. Однак інше більш масштабне дослідження, яке включало 681 пацієнтку, що отримували лікування у другому триместрі кліндаміцин у формі інтравагінального гелю не змогло продемонструвати жодного впливу на показники передчасних пологів або зниження ваги у новонароджених [24].

Існують докази рівня 1 щодо кліндаміцину як переважної або альтернативної терапії тазових інфекцій та як альтернативної терапії бактеріального вагінозу та *Chlamydia trachomatis* під час вагітності.

Фармакокінетика інтравагінальної форми кліндаміцину фосфату

У літературі є дані щодо доклінічного вивчення фармакокінетики кліндаміцину фосфату у вигляді вагінальних супозиторіїв [34]. Згідно результатів даних досліджень, кліндаміцин швидко всмоктується через слизову оболонку піхви щурів (t_{max} складав близько 2 годин) та визначається у крові протягом 6 годин після введення дози. Через 24 години концентрація кліндаміцину в крові піддослідних тварин падала нижче мінімальних значень, які можливо було визначити за допомогою використовуваного у дослідженні обладнання. Найвищі співвідношення концентрації препарату тканина/сироватки крові були виявлені в легенях та нирках. Крім того, у даних дослідженнях було виявлено, що кліндаміцин переважно окиснюється до кліндаміцину сульфоксиду, головним чином, за допомогою підроддини цитохромів CYP3A. Кліндаміцин також пригнічував ізоформу цитохрому CYP3A4, однак, повідомлялося, що кліндаміцин не повинен сут-

Таблиця 1. Фармакокінетичні параметри кліндаміцину в сироватці крові на 3-й день після триденного інтравагінального введення кліндаміцина фосфату в дозі 100 мг у вигляді супозиторіїв [5].

Показники	Середні значення	Діапазон значень
AUC ₀₋₂₄ (нг х год./мл)	3182±3081	421-11000
C _{max} (нг/мл)	270±244	26,7-666
t _{max} (год.)	4,6 ± 2,6	1,0-10
q _z (год. ⁻¹)	0,062 ± 0,043	0,020-0,156
t _{1/2} (год.)	11,2	4,44-34,6
F (%)	30,5 ± 21,4	6,47-70,4
FC _{max} (%)	7,91 ± 6,88	0,764-19,8

тево впливати на інші препарати, кліренс яких переважно залежить від CYP3A4 [17].

Особливості фармакокінетики кліндаміцина фосфату при введенні його жінкам у вигляді вагінальних супозиторіїв були вивчені у дослідженні Borin та співавторів у 1999 році [5].

У відкритому, рандомізованому, двосторонньому перехресному дослідженні прийняли участь 13 здорових жінок у віці від 18 до 45 років. Всім учасницям дослідження випадковим чином було по чергово (з інтервалом у 14 днів) призначено одну із двох схем введення кліндаміцина фосфату - інтравагінальне введення супозиторіїв у дозі 100 мг тричі з інтервалом в 24 години; інтравагінальне введення 2% крему у дозі 100 мг тричі з інтервалом в 24 години. Крім того, в якості еталонного лікування кожен суб'єкт отримував 100 мг дози стерильного розчину кліндаміцину фосфату (10 мг/мл), що вводився внутрішньовенно протягом 4 хвилин, протягом третього періоду дослідження. Для дослідження показників фармакокінетики при застосуванні інтравагінальних форм препарату зразки крові відбирали безпосередньо перед дозуванням на 1, 2 та 3 добу. Після третьої дози зразки крові відбирали на 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 42, 48, 60 та 72 години після введення препарату. При внутрішньовенному введенні препарату зразки крові відбиралися безпосередньо перед введенням, а також через 4, 10, 20, 40 хвилин та через 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 та 16 годин після введення дози кліндаміцину. Зразки крові центрифугували, збирали сироватку, негайно заморожували та зберігали при -20 °С до проведення аналізу. Фармакокінетичні параметри вивчали за допомогою чутливої та специфічної високоефективної рідинної хроматографії з детектуванням за допомогою потрійної квадрупольної мас-спектрометрії.

Основні фармакокінетичні параметри сироваткового кліндаміцину, отримані у даному дослідженні наведені у таблиці 1.

Згідно показникам площі під кривою співвідношення концентрації до часу (AUC), приблизно 30% (у межах від 6% до 70%) введеної дози зазнавало системного всмоктування на 3-й день застосування. Середнє значення площі під кривою (AUC) після триденного застосування

супозиторіїв було приблизно 3183 нг·год./мл (у межах від 421 до 11000 нг·год./мл). Максимальна концентрація (C_{max}) спостерігалася на 3-й день застосування вагінальних супозиторіїв та складала в середньому 270 нг/мл (у межах від 267 до 666 нг/мл) та трималася на такому рівні в середньому протягом близько 4,6 годин (t_{max}) після застосування (у межах від 1 до 10 годин). Для порівняння, площа під кривою та максимальна концентрація після одноразового внутрішньовенного введення препарату в середньому складали 10600 нг·год./мл (у межах від 5100 до 26000 нг·год./мл) та 3700 нг/мл (у межах від 2400 до 5000 нг/мл), відповідно.

Середні показники періоду напіввиведення (t_{1/2}) після застосування вагінальних супозиторіїв складали близько 11,2 години (у межах від 4 до 35 годин) та обмежувалися швидкістю всмоктування.

Загальна біодоступність складала в середньому 30,5% (у межах від 6,47% до 70,4%). Біодоступність при максимальній концентрації, при цьому, становила 7,91% (у межах від 0,764% до 19,8%).

Показники константи швидкості термінальної елімінації (λ_z) складали в середньому 0,062 год.⁻¹ (у межах від 0,020 до 0,156 год.⁻¹).

Результати цього дослідження показали, що системний вплив кліндаміцину (на основі AUC) при застосуванні у формі супозиторіїв був у середньому в 3 рази нижчим, ніж після одноразового внутрішньовенного введення субтерапевтичної дози кліндаміцину. Порівняно з аналогічною дозою кліндаміцину, введеного у вигляді вагінального крему системне всмоктування при застосуванні супозиторія було приблизно в 7 разів вищим (для вагінального крему середні значення AUC та C_{max} складали 400 нг·год./мл (у межах від 130 до 1160 нг·год./мл) 20 нг/мл (у межах від 10 до 70 нг/мл), відповідно). Крім того, рекомендована добова та загальна доза кліндаміцину у вигляді вагінальних супозиторіїв є набагато нижчою, ніж доза, що зазвичай призначається для перорального або парентерального введення (при застосуванні 100 мг кліндаміцину на добу протягом 3 днів у вигляді супозиторіїв кількість кліндаміцину, що абсорбується, становить близько 30 мг на добу, порівняно з 600-2700 мг на добу протягом 10 днів або більше при пероральному або парентеральному введенні).

Загалом, системний вплив кліндаміцину при застосуванні вагінальних супозиторіїв значно нижчий, ніж системний вплив від терапевтичної дози після застосування кліндаміцину гідрохлориду перорально (нижче в 2-20 разів) або застосування кліндаміцину фосфату парентерально (нижче в 40-50 разів) [1, 8, 11, 46].

Загалом, літературні дані демонструють доволі широкий діапазон значень фармакокінетичних показників. Враховуючи, що експериментальні дані проводилися на інтактних тваринах, а у клінічні дослідження були включені умовно здорові жінки, варіативність показників не можна пояснити впливом патологічного процесу на інтенсивність всмоктування препарату у слизовій піхви.

Тому, логічним є припущення, що фармакокінетичні показники залежать від ендogenous чинників. Одним із таких ендogenous модулаторів фармакологічних властивостей препаратів є гідроген сульфід.

Гідроген сульфід

Гідроген сульфід (H_2S) був вперше синтезований у 1777 році шведським хіміком Carl Wilhelm Scheele.

Гідроген сульфід широко розповсюджений у навколишньому середовищі та представляє собою легкозаймистий безбарвний газ з різким запахом "тухлих яєць". В природі, цей газ утворюється при розпаді білків, які містять сірковмісні амінокислоти. Гідроген сульфід є високотоксичною сполукою, в 5 разів більш токсичною ніж CO. Потрапляючи до організму у високих концентраціях дана сполука здатна інгібувати процеси тканинного дихання, пригнічуючи цитохром-с-оксидазу [20]. Проте, більше 30 років тому назад стало відомо, що гідроген сульфід синтезується практично всіма живими організмами. З кінця 80-х років XX століття інтерес до гідроген сульфіду значно посилюється у зв'язку з встановленням його причетності до регуляції фізіологічних функцій у тварин та людини. На сьогодні дану сполуку відносять до родини газотрансмітерів, яка включає нітроген монооксид (NO) та карбон монооксид (CO). Гідроген сульфід бере участь в регуляції судинного тону, нейромодуляції, цитопротекції, запаленні, апоптозі та інших процесах [16, 27, 47].

Гідроген сульфід є короткоживучою молекулою з періодом напіврозпаду у кілька хвилин. У водних розчинах при pH 7,4 20-30% гідроген сульфід існує в недисоційованій формі та 70-80% - у вигляді гідрогенсульфід-аніону ($H_2S \rightleftharpoons H^+ + HS^-$; $pK_a = 6.89$), який частково перетворюється в сульфід-аніон (S^{2-}). H_2S має високу ліпофільність і вдвічі легше розчиняється в ліпідних мембранах (коефіцієнт розподілу - 2,06), ніж у воді [10].

Основними субстратами для ендogenous гідроген сульфіду в тканинах є сірковмісні амінокислоти - L-цистеїн та L-гомоцистеїн, основними ферментами-продуцентами його є піридоксальфосфатзалежні ензими цистатіонін-β-синтаза (ЦБС, КФ 4.2.1.22), цистатіонін-γ-ліаза (ЦГЛ, КФ 4.4.1.1), а також цистеїнамінотрансфераза (ЦАТ, КФ 2.6.1.3).

До основних реакцій, які забезпечують утворення гідроген сульфіду в тканинах тварин та людини, відносять [40]:

1. Десульфуровування L-цистеїну до пірувату за участі ЦГЛ.
2. Конденсації L-гомоцистеїну з L-цистеїном та десульфуровування L-цистеїну до L-серину за участі ЦБС.
3. Трансамінування L-цистеїну з α-кетоглутаратом за участі ЦАТ з утворенням 3-меркаптопірувату, з якого далі вивільняється H_2S за участі 3-меркаптопіруватсульфур-

рансферази (3-МСТ, КФ 2.8.1.2).

В організмі гідроген сульфід виконує роль сигнальної молекули, газотрансмітера, специфічних рецепторів для якого не знайдено. Молекулярними мішенями H_2S виступають різні іонні канали, рецептори, ензими та протеїни, які регулюють широке коло біохімічних та фізіологічних процесів [28].

Вміст H_2S в плазмі крові тварин (щурі) та людини становить близько 50-80 мкМ [47], тоді як в тканинах H_2S міститься в більш значних кількостях, і його концентрація в різних органах досить сильно варіює. З порушеннями вмісту та продукції H_2S в тканинах асоціюються різні патологічні стани. Зниження базального вмісту H_2S в плазмі крові відмічається у хворих з артеріальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця, тромбозами глибоких вен нижніх кінцівок, хворобою Альцгеймера, гіпергомоцистеїнемією [6, 12, 23, 48, 49]. На противагу цьому, в багатьох випадках, рівень гідроген сульфіду збільшується, наприклад, при цукровому діабеті, панкреатиті, перитоніті, шоківих станах [4, 49].

Не менш цікавим є здатність гідроген сульфіду модулювати відповідь організму на запалення (зменшення набряку, зниження інтенсивності болю, зменшення нейтрофільної інфільтрації в осередку запалення) [3] та стимулювати ангиогенез (стимуляція проліферації клітин ендотелію) [47, 50].

Таким чином, модулюючи перебіг багатьох фізіологічних процесів в організм як шляхом прямої активації або модуляції каналів, рецепторів та ферментів, так і шляхом модуляції активності ферментів за допомогою внутрішньоклітинної сигналізації, гідроген сульфід змінює умови, в яких діють лікарські засоби, а, отже, і їх фармакокінетичні особливості та фармакологічні ефекти. На нашу думку, перспективним як у науковому, так і у практичному плані є дослідження фармакологічних особливостей ліків в залежності від фонового рівня гідроген сульфіду в організмі.

Висновки та перспективи подальших розробок

1. Широкий та різноплановий вплив ендogenous гідроген сульфіду на перебіг біохімічних та фізіологічних процесів в організмі спонукає до вивчення його потенційного модулюючого впливу на фармакологічні властивості препаратів.

Доклінічне дослідження фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів (зокрема, кліндаміцину) дозволить в подальшому оптимізувати терапевтичні схеми з урахуванням рівня гідроген сульфіду в організмі, а також розробити нові способи модуляції властивостей вже існуючих препаратів шляхом змін фонового рівня гідроген сульфіду.

Список посилань - References

1. AHFS Drug Information 2018. McEvoy, G. K. (Ed.). (2018). Clindamycin Hydrochloride, Clindamycin Palmitate Hydrochloride, Clindamycin Phosphate. American Society of Health-System Pharmacists.
2. Bautista, C. T., Wurapa, E., Sateren, W. B., Morris, S., Hollingsworth, B., & Sanchez, J. L. (2016). Bacterial vaginosis:

- a synthesis of the literature on etiology, prevalence, risk factors, and relationship with chlamydia and gonorrhea infections. *Military Medical Research*, 3, 4. <https://doi.org/10.1186/s40779-016-0074-5>
3. Bhatia, M., & Gaddam, R. R. (2020). Hydrogen Sulfide in Inflammation: A Novel Mediator and Therapeutic Target. *Antioxidants & redox signaling*, 10.1089/ars.2020.8211. Advance online publication. <https://doi.org/10.1089/ars.2020.8211>
 4. Bhatia, M., Wong, F. L., Fu, D., Lau, H. Y., Mochhala, S. M., & Moore, P. K. (2005). Role of hydrogen sulfide in acute pancreatitis and associated lung injury. *FASEB journal: official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology*, 19 (6), 623-625. <https://doi.org/10.1096/fj.04-3023fje>
 5. Borin, M. T., Ryan, K. K., & Hopkins, N. K. (1999). Systemic absorption of clindamycin after intravaginal administration of clindamycin phosphate ovule or cream. *Journal of clinical pharmacology*, 39 (8), 805-810. <https://doi.org/10.1177/00912709922008461>
 6. Cai, H., & Wang, X. (2020). *Effect of sulfur dioxide on vascular biology. Histology and histopathology*, 18290. Advance online publication. <https://doi.org/10.14670/HH-18-290>
 7. Ceccarani, C., Foschi, C., Parolin, C., D'Antuono, A., Gaspari, V., Consolandi, C., ... & Marangoni, A. (2019). Diversity of vaginal microbiome and metabolome during genital infections. *Scientific reports*, 9 (1), 14095. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-50410-x>
 8. Clinical Pharmacology and Biopharmaceutics Review(s): Clindamycin phosphate vaginal suppository (50-767). 1999. Retrieved from https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/99/50767_Cleocin_biopharmr.pdf.
 9. Coudray, M. S., & Madhivanan, P. (2020). Bacterial vaginosis - A brief synopsis of the literature. *European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology*, 245, 143-148. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2019.12.035>
 10. Cuevasanta, E., Denicola, A., Alvarez, B., & M?ller, M. N. (2012). Solubility and permeation of hydrogen sulfide in lipid membranes. *PLoS one*, 7 (4), e34562. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0034562>
 11. Dhawan, V. K., & Thadepalli, H. (1982). Clindamycin: a review of fifteen years of experience. *Reviews of infectious diseases*, 4 (6), 1133-1153. <https://doi.org/10.1093/clinids/4.6.1133>
 12. Du, J., Yan, H., & Tang, C. (2003). Endogenous H₂S is involved in the development of spontaneous hypertension. *Beijing da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Peking University. Health sciences*, 35 (1), 102. Retrieved from <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12920821/>
 13. Eastment, M. C., & McClelland, R. S. (2018). Vaginal microbiota and susceptibility to HIV. *AIDS (London, England)*, 32 (6), 687-698. <https://doi.org/10.1097/QAD.0000000000001768>
 14. Faught, B. M., & Reyes, S. (2019). Characterization and Treatment of Recurrent Bacterial Vaginosis. *Journal of women's health*, 28 (9), 1218-1226. <https://doi.org/10.1089/jwh.2018.7383>
 15. Faure, K., Dessein, R., Vanderstichele, S., & Subtil, D. (2019). Endom?trites du post-partum. RPC infections genitales hautes CNGOF et SPILF [Postpartum endometritis: CNGOF and SPILF Pelvic Inflammatory Diseases Guidelines]. *Gynecologie, obstetrique, fertilit? & senologie*, 47 (5), 442-450. <https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.03.013>
 16. Gadalla, M. M., & Snyder, S. H. (2010). Hydrogen sulfide as a gasotransmitter. *Journal of neurochemistry*, 113 (1), 14-26. <https://doi.org/10.1111/j.1471-4159.2010.06580.x>
 17. Guengerich F. P. (1992). Characterization of human cytochrome P450 enzymes. *FASEB journal: official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology*, 6 (2), 745-748. <https://doi.org/10.1096/fasebj.6.2.1537465>
 18. Hillier, S. L., Nugent, R. P., Eschenbach, D. A., Krohn, M. A., Gibbs, R. S., Martin, D. H., ... & Rao, A. V. (1995). Association between bacterial vaginosis and preterm delivery of a low-birth-weight infant. The Vaginal Infections and Prematurity Study Group. *The New England journal of medicine*, 333 (26), 1737-1742. <https://doi.org/10.1056/NEJM199512283332604>
 19. Homayouni, A., Bastani, P., Ziyadi, S., Mohammad-Alizadeh-Charandabi, S., Ghalibaf, M., Mortazavian, A. M., & Mehrabany, E. V. (2014). Effects of probiotics on the recurrence of bacterial vaginosis: a review. *Journal of lower genital tract disease*, 18 (1), 79-86. <https://doi.org/10.1097/LGT.0b013e31829156ec>
 20. Jackson, M. R., Melideo, S. L., & Jorns, M. S. (2012). Human sulfide:quinone oxidoreductase catalyzes the first step in hydrogen sulfide metabolism and produces a sulfane sulfur metabolite. *Biochemistry*, 51 (34), 6804-6815. <https://doi.org/10.1021/bi300778t>
 21. Javed, A., Parvaiz, F., & Manzoor, S. (2019). Bacterial vaginosis: An insight into the prevalence, alternative treatments regimen and it's associated resistance patterns. *Microbial pathogenesis*, 127, 21-30. <https://doi.org/10.1016/j.micpath.2018.11.046>
 22. Jayaram, P. M., Mohan, M. K., & Konje, J. (2020). Bacterial vaginosis in pregnancy - a storm in the cup of tea. *European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology*, 253, 220-224. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2020.08.009>
 23. Jiang, H. L., Wu, H. C., Li, Z. L., Geng, B., & Tang, C. S. (2005). Changes of the new gaseous transmitter H₂S in patients with coronary heart disease. *Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao, Academic journal of the first medical college of PLA*, 25 (8), 951-954.
 24. Joesoef, M. R., Hillier, S. L., Wiknjosastro, G., Sumampouw, H., Linnan, M., Norojono, W., ... & Utomo, B. (1995). Intravaginal clindamycin treatment for bacterial vaginosis: effects on preterm delivery and low birth weight. *American journal of obstetrics and gynecology*, 173 (5), 1527-1531. [https://doi.org/10.1016/0002-9378\(95\)90644-4](https://doi.org/10.1016/0002-9378(95)90644-4)
 25. Kahwati, L. C., Clark, R., Berkman, N. D., Urrutia, R., Patel, S. V., Zeng, J., & Viswanathan, M. (2020). Screening for Bacterial Vaginosis in Pregnant Adolescents and Women to Prevent Preterm Delivery: Updated Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. *JAMA*, 323 (13), 1293-1309. doi: 10.1001/jama.2020.0233
 26. Kenyon, C., Colebunders, R., & Crucitti, T. (2013). The global epidemiology of bacterial vaginosis: a systematic review. *American journal of obstetrics and gynecology*, 209 (6), 505-523. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2013.05.006>
 27. Kimura, H. (2011). Hydrogen sulfide: its production, release and functions. *Amino acids*, 41 (1), 113-121. <https://doi.org/10.1007/s00726-010-0510-x>
 28. Kimura, H. (2014). Production and physiological effects of hydrogen sulfide. *Antioxidants & redox signaling*, 20 (5), 783-793. <https://doi.org/10.1089/ars.2013.5309>
 29. Li, H. M., Sung, F. C., Li, S. C., Huang, Y. K., Chang, Y., Chang, C. C., ... & Kao, C. H. (2018). The effect of antibiotic prophylaxis for acute pelvic inflammatory disease after hysterosalpingography: a retrospective cohort study. *Current medical research and opinion*, 34 (7), 1271-1276. <https://doi.org/10.1080/03007995.2017.1417243>
 30. ?owicka, E., & Be?owski, J. (2007). Hydrogen sulfide (H₂S) - the third gas of interest for pharmacologists. *Pharmacological reports*, 59 (1), 4-24. Retrieved from <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17377202/>
 31. Mastromarino, P., Hemalatha, R., Barbonetti, A., Cinque, B., Cifone, M. G., Tammaro, F., & Francavilla, F. (2014). Biological

- control of vaginosis to improve reproductive health. *The Indian journal of medical research*, 140 (1), S91-S97. Retrieved from <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25673551/>
32. McGregor, J. A., French, J. I., & Seo, K. (1991). Adjunctive clindamycin therapy for preterm labor: results of a double-blind, placebo-controlled trial. *American journal of obstetrics and gynecology*, 165 (4, 1), 867-875. [https://doi.org/10.1016/0002-9378\(91\)90430-y](https://doi.org/10.1016/0002-9378(91)90430-y)
 33. Murphy, P. B., Bistas, K. G., & Le, J. K. (2020). Clindamycin. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519574/>
 34. Public Assessment Report: Dalacin Vaginal Ovules (PA0822/119/001). (2018). Retrieved from https://www.hpra.ie/img/uploaded/swedocuments/LicenseSPC_PA0822-119-001_14082018162050.pdf
 35. Reda, S., Gonzalves, F. A., Mazepa, M. M., & De Carvalho, N. S. (2018). Women infected with HIV and the impact of associated sexually transmitted infections. *International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics*, 142 (2), 143-147. <https://doi.org/10.1002/ijgo.12507>
 36. Redelinguys, M. J., Geldenhuys, J., Jung, H., & Kock, M. M. (2020). Bacterial Vaginosis: Current Diagnostic Avenues and Future Opportunities. *Frontiers in cellular and infection microbiology*, 10, 354. <https://doi.org/10.3389/fcimb.2020.00354>
 37. Reiter, S., & Kellogg Spadt, S. (2019). Bacterial vaginosis: a primer for clinicians. *Postgraduate medicine*, 131 (1), 8-18. <https://doi.org/10.1080/00325481.2019.1546534>
 38. Savaris, R. F., Fuhrich, D. G., Maissiat, J., Duarte, R. V., & Ross, J. (2020). Antibiotic therapy for pelvic inflammatory disease. *The Cochrane database of systematic reviews*, 8, CD010285. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD010285.pub3>
 39. Schwarz, S., Shen, J., Kadlec, K., Wang, Y., Brenner Michael, G., Feßler, A. T., & Vester, B. (2016). Lincosamides, Streptogramins, Phenolics, and Pleuromutilins: Mode of Action and Mechanisms of Resistance. *Cold Spring Harbor perspectives in medicine*, 6 (11), a027037. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a027037>
 40. Shibuya, N., & Kimura, H. (2013). Production of hydrogen sulfide from d-cysteine and its therapeutic potential. *Frontiers in endocrinology*, 4, 87. <https://doi.org/10.3389/fendo.2013.00087>
 41. Soper D. E. (2020). Bacterial vaginosis and surgical site infections. *American journal of obstetrics and gynecology*, 222 (3), 219-223. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2019.09.002>
 42. Spizek, J., & Rezanka, T. (2017). Lincosamides: Chemical structure, biosynthesis, mechanism of action, resistance, and applications. *Biochemical pharmacology*, 133, 20-28. <https://doi.org/10.1016/j.bcp.2016.12.001>
 43. Tomas, M., Palmeira-de-Oliveira, A., Simoes, S., Martinez-de-Oliveira, J., & Palmeira-de-Oliveira, R. (2020). Bacterial vaginosis: Standard treatments and alternative strategies. *International journal of pharmaceutics*, 587, 119659. <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2020.119659>
 44. Tomas, M. S., Claudia Otero, M., Ocana, V., & Elena Nader-Macias, M. (2004). Production of antimicrobial substances by lactic acid bacteria I: determination of hydrogen peroxide. *Methods in molecular biology* (Clifton, N.J.), 268, 337-346. <https://doi.org/10.1385/1-59259-766-1:337>
 45. Vazquez, F., Fernandez-Blazquez, A., & Garcia, B. (2019). Vaginosis. Vaginal microbiota. Vaginosis. Microbiota vaginal. *Enfermedades infecciosas y microbiologia clinica*, 37 (9), 592-601. <https://doi.org/10.1016/j.eimc.2018.11.009>
 46. von Hattingberg, H. M. (1977). Pharmacokinetic von Lincomycin und Clindamycin. *Infection*, 5, 29-36. <https://doi.org/10.1007/BF01639133>
 47. Wang, R. (2002). Two's company, three's a crowd: can H₂S be the third endogenous gaseous transmitter? *FASEB journal: official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology*, 16 (13), 1792-1798. <https://doi.org/10.1096/fj.02-0211hyp>
 48. Whiteman, M., Le Trionnaire, S., Chopra, M., Fox, B., & Whatmore, J. (2011). Emerging role of hydrogen sulfide in health and disease: critical appraisal of biomarkers and pharmacological tools. *Clinical science* (London, England: 1979), 121 (11), 459-488. <https://doi.org/10.1042/CS20110267>
 49. Xiao, Q., Ying, J., Xiang, L., & Zhang, C. (2018). The biologic effect of hydrogen sulfide and its function in various diseases. *Medicine*, 97 (44), e13065. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000013065>
 50. Zhou, Y., Li, X. H., Zhang, C. C., Wang, M. J., Xue, W. L., Wu, D. D., ... & Zhu, Y. C. (2016). Hydrogen sulfide promotes angiogenesis by downregulating miR-640 via the VEGFR2/mTOR pathway. *American journal of physiology. Cell physiology*, 310 (4), C305-C317. <https://doi.org/10.1152/ajpcell.00230.2015>

INTRAVAGINAL USE OF CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN THERAPY OF BACTERIAL VAGINOSIS: PECULIARITIES OF PHARMACOKINETICS DEPENDING ON THE LEVEL OF HYDROGEN SULFIDE IN THE ORGANISM (LITERATURE REVIEW)

Grebeniuk D. I., Taran I. V., Nazarchuk O. A.

Annotation. The article provides an overview of modern literature data on the problems of bacterial vaginosis, its therapy with clindamycin, the pharmacokinetics of this pharmacological drug, and the potential effect of the background level of hydrogen sulfide in the body on the pharmacokinetics of drugs. From PubMed, ScienceDirect, UpToDate databases, 50 sources were selected that met the conditions of the query: the latest publications (for the last 5 years), or the latest publications on this issue (regardless of age). The wide and diverse influence of endogenous hydrogen sulfide on the course of biochemical and physiological processes in the body prompts the study of its potential modulating effect on the pharmacological properties of drugs. A preclinical study of the pharmacokinetics and pharmacodynamics of drugs (in particular, clindamycin) will further optimize therapeutic regimens taking into account the level of hydrogen sulfide in the body, as well as create the preconditions for the development of new effective pharmaceutical compositions of antibiotics and hydrogen sulfide donors.

Keywords: bacterial vaginosis; clindamycin phosphate; hydrogen sulfide; pharmacokinetics.